

SOBRE UNA PEQUEÑA COLECCIÓN DE
MALOFAGOS DEL PARAGUAY

(INSECTA PHTHIRAPTERA)

Se comunica en esta nota el resultado del examen de un pequeño número de lotes de Mallophaga provenientes de Villarrica, República del Paraguay, colectados por F.H. Schade entre 1946 y 1948, gentilmente cedida por los Dres. A. Mauri y P. Duret y que incluye seis especies.

Myrsidea victrix Waterston, 1915 (*sensu lato*): Se examinaron 3 ♀♀ y 5 ninfas II provenientes de un ejemplar de *Rhamphastos toco albogularis* Cabanis. De aceptarse las subespecies erigidas por Carriker y Díaz-Hungria (*Nov. Cient. Mus. Hist. Nat. La Salle, Zool.*, 28:11-18, 1960), el lote estudiado debe atribuirse a *M. v. waterstoni* Carriker & Díaz-Hungria.

Menacanthus balfouri Waterston, 1915 (*sensu lato*): Se examinó una ninfa II obtenida junto a la especie anterior. Probablemente las subespecies erigidas por Carriker y Díaz-Hungria (*op. cit.*: 27-35) carezcan de validez por lo poco consistente de las diferencias consideradas, algunas de ellas (v.g. genitalia ♂) debidas a meros artefactos de técnica. En el género *Rhamphastos* probablemente exista una especie única, *M. balfouri*, con algunas variaciones atribuibles a diferencias poblacionales en los diferentes hospedadores.

Cuculiphilus (*Cuculiphilus*) *snodgrassi* (Kellog & Kuwana, 1902): Se examinaron 2 ♂♂ y 6 ♀♀ obtenidos de un ejemplar de *Coccyzus melanocoryphus* Vieillot. Es una especie fácilmente identificable a partir de la revisión del género efectuada por Scharf y Price (*Ann. ent. Soc. Amer.*, 58 [4]: 546-555, 1965).

Strigiphilus speotyti (Osborn, 1896): Se examinó un lote que contiene numerosos machos, hembras y ninfas, obtenido de un ejemplar de *Athene c. cunicularia* (Molina). Es una especie que se distribuye en varias subespecies de *A. cunicularia*, en las que es común hallarla, a veces en cantidades considerables.

Penenirmus auritus (Scopoli, 1763): Se examinó un lote que contiene numerosos machos y hembras, obtenido de *Leuconerpes candidus* (Otto), que es un nuevo hospedador para esta especie, que está ampliamente distribuida en muchos Picidae, como puede verse en la revisión efectuada por Dalglish (*J.N.Y. ent. Soc.*, 80: 83-104, 1972).

Brueelia infusata Cicchino, 1979: El lote tipo de esta especie fue colectado junto a la especie anterior (4 ♂♂, 4 ♀♀ y 1 ninfa III) y su descripción puede consultarse en *Rev. Soc. ent. Arg.*, 38 (1-4): 91-96.

Armando C. Cicchino
Musco de La Plata